

Aktiviti

Aktiviti

PEMANTAUAN SERANGGA PEROSAK

NOTA: Amalkan pemantauan kesan serangan serangga perosak dan jika perlu boleh dikawal dengan penyemburancan racun serangga yang disarankan

14 - 80

Kawal Serangga **Bena Perang** dengan racun berbahaya aktif seperti:

1. Fipronil
(Regent 50SC)
2. Pymetrozine
(Plenum)



BENA PERANG

14 - 80

Kawal **Ulat Penggorek Batang** dengan racun berbahaya aktif seperti:

1. Imidacloprid
(Avador)
2. Fipronil
(Regent 50SC)



LARVA
DEWASA

14 - 80

Kawal **Ulat Gulung Daun** dengan racun berbahaya aktif seperti:

1. Lufenuron
(Match 050EC)
2. Imidacloprid
(Fusilier)



LARVA
DEWASA

60 - 80

Kawal **Kesisang** dengan racun berbahaya aktif seperti:

1. Cypermethrin
(Ripcord)
2. Deltamethrin
(Decis / Shieldmate)



KESISANG

PEMANTAUAN HAIWAN PEROSAK

0 - 94



TIKUS

Kawal **Tikus** menggunakan racun umpan Tikus berbahaya aktif Broadifacoum seperti **Rattus / Matikus**



60 - 94



BURUNG

Mengawas dan menghalau **burung pipit** dengan menyediakan telinting atau **memasang pukat**



70 - 80

84 - 94

PENUAIAN

Keluarkan air dari ladang sehingga kering

Tuai padi apabila **85% - 90%** padi telah **masak** dan mencapai **tahap peratus kelembapan 18-22%**.

KRITERIA PADI YANG DITERIMA DI BAWAH SKIM BANTUAN HARGA PADI JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN

BIL	FAKTOR	HAD DITERIMA (%)
1	BIJI PADI TULEN (Min.)	90
2	BAHAN LENGAI (Mak.)*	6
3	PADI HIJAU / MUDA (Mak.)	2
4	PADI ROSAK/BERUBAH WARNA/BAU (Mak.)	2
5	KANDUNGAN KELEMBAPAN	10 - 13

*Bahan lengai adalah termasuk hampa, batang padi, biji rumpai dan lain-lain bahan organik dan inorganik



Hari
Selepas
Tanam

Aktiviti

-30

Tebas jerami



-29

Hapuskan rumpai dengan racun berbahaya aktif Glyphosate Isopropylamine seperti **Peladang Up**



-21

Bajak kering



-19

Tabur baja:
1. kapur Dolomit (6ton/ha)
2. Kompos (5ton/ha)
3. Triple Super Phosphate (TSP) (125kg/ha)
4. Potassium Chloride (KCL) (75kg/ha)



-19

Perbaiki batas dan bersihkan longkang



-18

Rawat benih padi dengan racun kulat (3g Benomyl dan 3g Mancozeb bagi setiap 1kg Padi)



-18

Rendam benih padi **12-24 jam**



-17

Peram benih padi **24 - 36 jam** hingga keluar mata



-16

Semai benih padi.
Kadar benih: **36-40kg/ha**



Hari
Selepas
Tanam

Aktiviti

-14

Radu basah (Pertama)



-7

Radu basah (Kedua)



-1

Meratakan tanah



-1

Kawal siput dengan racun berbahaya aktif Niclosamide Ethanolamine (**Bayluscide**)



-1

Kawal biji benih rumpai dengan racun pracambah berbahaya aktif Pretilachor & Pyribenzoxim (**Solito**)



0

Pindah tanam (Umur padi **14 - 18 Hari**)



3

Masukkan air hingga paras 3-5cm dankekalkan



4-7

Sulam padi diruang yang kosong



KAWALAN RUMPAI

7-14

Kawal rumpai dengan racun berbahaya aktif Propanil + Thiobencarb (**Satunil**)



21 - 28

Kawal rumpai berdaun lebar dengan racun berbahaya aktif 2-4 D-dimethylammonium (**Amine**)



Hari
Selepas
Tanam

Aktiviti

10

JADUAL PEMBAJAAN

Baja Pertama:

1. NPK 100kg/ha
2. TSP 50kg/ha

Baja Kedua:


1. NPK 150kg/ha

Baja Ketiga:

1. MOP 50kg/ha

PEMANTAUAN PENYAKIT

14 - 85



KARAH/BURUK TANGAI



HAWAR SELUDANG



BINTIK DAUN

Kawal penyakit Karah / Buruk Tangai, Hawar Seludang atau Bintik Daun apabila terdapat tanda serangan dengan racun berbahaya aktif seperti:

1. Azoxystrobin + Difenoconazole (**Amistarop/ Annex Combi SC**)
2. Trifloxytrobin 25% + Tebuconazole (**Nativo**)
3. Azoxystrobin (**Amistar**)